

## معرفة RU 486 ، لاختيار واعي

### ما هو الإجهاض الصيدلي وكيف يعمل

والإجهاض الدوائي لا ينبغي الخلط بينه وبين حبة الصباح التالي ، والتي يجب أن تستخدم في غضون 3 أيام من العلاقة الجنسية.

الإجهاض الدوائي هو فعال في غضون الأسبوع 9 من الحمل ، ولكن في إيطاليا هو مسموح به للاستخدام فقط في الأسبوع ال 7 (أي في غضون 49 يوما ابتداء من اليوم الأول من فترة الحيض الماضي).

الإجهاض الطبي يحدث بأخذ حبتين، الميفيبريستون والبروستاجلاندين ، يأخذ في أيام مختلفة ، مما يعقب آلية بيولوجية من الإجهاض التلقائي.

### فعالية الطريقة

الأسلوب يوفر كل من الجرعة الفعالة هي بين 92 % و 99 % من الحالات. في حوالي 5 % من الحالات تحتاج لتدخل جراحي لإتمام الإجهاض أو لوقف أي نزيف التي قد تحدث.

### الإجابيات

الأسلوب لا يتطلب عملية جراحية أو تخدير ، لا يمثل خطر. كالصدمة أو الرحم وعنق الرحم وخطر العقم إذا تكررت وقائع عملية جراحية ، والعدوى والنزيف...

### السلبيات

قد يكون هناك أكثر تتطلب جهدا بدنيا ونفسيا لأنها تتطلب وقتا أكثر مما شفتط AVG الكلاسيكية.

### في المستوصف

والمرأة الراغبة في استخدام RU486 تلقي ورقة المعلومات المفصلة التي تقدم بديلين للإجهاض بالجراحة أو بالأدوية المخدرات لإجهاض ويفسر المسار الذي يمكن أن تتم به فقط في الأسبوع السابع من الحمل.

ان ورقة المعلومات تحدد بالتفصيل الخطوات والإجراءات التي تتوقف ، وكيفية استخدام اثنين من العقاقير ، ومعدلات نجاح محددة ، والإبلاغ عن أي مشاكل وعيوب.

مع الذكر أيضا أنها في أي وقت يمكن أن تقابل العامل الاجتماعي ، ولكن ، عالم للنفس أو طبيب نسائي

### في المستشفى – العيادة AVG

بالإضافة إلى التأكد من طلب عمليات الاجهاض AVG ، يجب أداء الامتحانات اللازمة -الزيارة ، الموجات فوق الصوتية ، وأخذ عينات الدم- يناقش الطبيب مع المريض دواء الإجهاض ، ويدعو إلى مواضيع بديلة للجراحة مع الاشارة. المستشفيات في مدينة ميلانو ، وبالتالي من المحتمل أيضا في لومبارديا ، ويؤكد على اختيار نموذج الموافقة المستنيرة ويسلط الضوء على المخاطر المرتبطة باستخدام RU486

### في المستشفى – تناول الدواء

هذه المرحلة تتطلب دخول المستشفى لمدة ثلاثة أيام. ويجب على المعنية أن تصل الى المستشفى بسرعة ومزودة بطاقة صحية ، وثيقة الهوية وطلب الشهادة من أجل الوقف الطوعي للحمل. في اليوم الأول ستصبح اول عقار عن طريق الفم (3 أقراص 200 ملغ

من 486 رو ميفبريستون) وبعد ذلك سيتم الاحتفاظ تحت المراقبة لمدة يومين .وسيقدم اليوم الثالث للعقار الثاني عن طريق المهبل (1mg البييض 1 من الطريق Gemeproست المهبلية .)وينبغي أن المرأة لا تزال في المستشفى حتى الانتهاء من الإجهاض التي يمكن العثور عليها في فترة ما بعد الظهر من اليوم الثالث.

وسيتم في وقت الاستقالة سيتم تسليم ورقة تعليمات لاتباعها ، وسوف يكون الموعد المقرر في 14 يوما بعد الجراحة ، والتي يجب التحقق من حضور الانقطاع. وكانت المرأة قد ، تحت مسؤوليتها ، على التوقيع على الاستقالة بعد تناول الدواء الأول والعودة الى الوطن لعودة في اليوم الثالث من العقار الثاني للتوظيف والانتهاء من الإجهاض : في حالة حدوث مشاكل يمكن ومن الواضح أن تذهب إلى المستشفى في أي وقت.